

腫瘤用藥指導

編號-
門診化療室編製 98-08 第一版

Platinex® (Cisplatin) 10 mg/ml(針劑) 鉑帝爾

<藥物效用>

- 一、此藥是屬烷基化類的抗腫瘤藥，用以治療癌症，如：轉移性的睪丸癌、轉移性的卵巢癌、晚期的膀胱癌。
- 二、本藥亦可用於治療其他的疾病(如肺癌)，若需進一步資訊，可請教您的醫(藥)師。
- 三、本藥為含鉑化合物，可用於減緩或停止您身體內的癌細胞的生長。

<服藥指示>

請遵循醫師指示。

<注意事項>

- (1) 若您對於 Cisplatin 或任何其他的含鉑化合物(如：Carboplatin)或其他藥物過敏，請告知您的醫(藥)師。
- (2) 當您所使用處方或非處方的藥物，包含有阿斯匹林及維他命，請告知您的醫(藥)師。
- (3) 若您(曾)有腎臟疾病，請告知您的醫(藥)師。
- (4) 本藥可能會干擾女性的月經週期以及可能會停止男性精子產生；女性有懷孕應告訴您的醫師；Cisplatin 可能會傷害胎兒，若在接受化療期間或化療之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時確實做好避孕措施以避免懷孕。
- (5) 因 Cisplatin 會分泌到乳汁的，所以使用此藥時不可哺乳。
- (6) 若您有要接種任何疫苗(如：麻疹或流行性感感冒疫苗)，請告知您的醫師。
- (7) 治療期間，容易感染，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。
- (8) Cisplatin 會引起嚴重的腎臟傷害及聽力喪失。若有發生下述之情形請立刻通知您的醫師：失去平衡、小便疼痛或紅尿、聽力困難、幻聽。
- (9) 給藥後 1~2 天需維持體內大量的水分，以避免腎臟的損害，可每日補充 2~3L 的水分。

<副作用>

此單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

- (1) 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：頭髮變稀薄或易斷、腹瀉、味覺的改變、指尖或腳尖麻木或刺痛、噁心、嘔吐、食慾或體重降低。這些症狀會隨時間慢慢減弱。
- (2) 下述症狀若有持續或加重：嘔吐、疲勞。請告知您的醫師。
- (3) 若您有產生下述症狀，請立刻通知您的醫師：不尋常的挫傷或出血、發燒、發疹、糞便黑、黏；寒顫、暈眩的感覺或頭昏眼花、身體的側邊或背後疼痛、呼吸短促或喘氣、腳或足踝腫大、病情發作。

* 相關副作用之處理歡迎進入腫瘤科網站查詢 或諮詢腫瘤科衛教師 *

腫瘤治療科