

腫瘤用藥指導

編號-
門診化療室編製 98-08 第一版

Dacarbazine® (Dacarbazine) 200 mg/vial(針劑) 達卡巴仁

<藥物效用>

- 一、此藥是屬烷基化類抗腫瘤藥，用以治療癌症，如：黑色素瘤；何杰金氏症。
- 二、本藥亦可用於治療其他的疾病（如：軟組織肉瘤），若需進一步資訊，可請教您的醫（藥）師。
- 三、本藥可用於減緩或停止您體內癌細胞的生長。

<服藥指示>

請遵循醫師指示。

<注意事項>

- (1) 若您對於 Dacarbazine 或任何其他藥物過敏，請告知您的醫（藥）師。
- (2) 當您所使用處方或非處方的藥物，包含有阿斯匹林及維他命，請告知您的醫（藥）師。
- (3) 若您（曾）有肝臟疾病，請告知您的醫（藥）師。
- (4) 本藥可能會干擾女性的月經週期以及可能會停止男性精子產生；女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，若在接受化療期間或化療之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時確實做好避孕措施以避免懷孕。
- (5) 若您有要施打任何疫苗（如：麻疹或流行性感疫苗），請先告知您的醫師。
- (6) 治療期間，容易感染，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。
- (7) 易對光敏感，故出門時請做好防曬措施。

<副作用>

- (1) 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：噁心及嘔吐、食慾降低、類似感冒的症狀（如：發燒、寒顫、虛弱、肌肉酸痛、頭痛、鼻塞），通常在治療的 7 天內發生。這些症狀會隨時間慢慢減弱。
- (2) 下述症狀若有持續或加重：疲勞。請告知您的醫師。
- (3) 若您有產生下述症狀，請立刻告知您的醫師：不尋常的出血或挫傷、注射部位疼痛、咳嗽、喉嚨痛、頭暈、藥物注射時有刺痛或灼熱的感覺。

* 相關副作用之處理歡迎進入腫瘤科網站查詢 或諮詢腫瘤科衛教師 *

腫瘤治療科

此單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。